

Bestimmungshilfe Kot

Hermelin, *Mustela erminea*

Kot etwas grösser, meist BR = 0,5-0,6 cm. Geruch nach Stroh und süsslichem Moschus und nicht unangenehm. Kot schwärzlich, oft gut sichtbar deponiert auf Wegen, kleinen Mauern, nahe von Alphäusern. LA = 4-8 cm; BR = 0,4-0,7 cm.



Mauswiesel, *Mustela nivalis vulgaris*

Kot kleiner, meist BR = 0,2-0,4 cm. Geruch stärker moschusartig. Nicht immer leicht vom Kot des Hermelins zu unterscheiden. Kot schwärzlich, schwierig zu finden. Manchmal gut sichtbar abgesetzt auf einem Stein, kleinen Mauer, selten nahe der Häuser. LA = 2,5-5 cm; BR = 0,2-0,5 cm.



Iltis, *Mustela putorius*

Kot von ähnlichem Aussehen, jedoch mit kleinerem Durchmesser, meist BR = 0,6-0,9 cm). Am Boden abgesetzt und in den unteren Teilen von Gebäuden. Geruch oft unangenehm, wie übel riechendes Fleisch. Etwas weich und kann im Unterschied zum Stein- und Baumarder Knochenüberreste von Amphibien (kurze und hohle Knochen) oder Fischresten enthalten. Braun bis schwarz, enthält allerlei Nahrungsrückstände jedoch selten Früchte. Manchmal Ansammlung von Kot in der Nähe des Baus. LA = 5-8 cm; BR = 0,5-1 cm.



Steinmarder, *Martes foina*

Kot von ähnlichem Aussehen, aber mit abstossendem Geruch, schärfer. Kot in allen möglichen Lebensräumen abgesetzt, aber Unterscheidung vom Baumarder möglich, falls der Kot in einem regelmässig bewohnten Gebäude (Haus, Scheune, Fabrik) liegt. Unterscheidung vom Iltis möglich, falls der Kot an erhöhten und schwer erreichbaren Stellen (Estrich, Dachboden, usw.) deponiert wurde. Braun bis schwarz, manchmal weisslich, enthält im Gegensatz zum Baumarder unterschiedlichste Nahrungsrückstände, so Überreste von Abfällen (Plastik, Eisen, usw.). Manchmal Ansammlung von Kot am Lagerplatz. LA = 6-11 cm; BR = 0,7-1,3 cm.



Baumarder, *Martes martes*


Kot oft schwierig zu unterscheiden in Abwesenheit von anderen Spuren (Trittsiegel, Standort, usw.). Kot meist stumpf an einem Ende, spitz zulaufend am anderen Ende. Gerade oder hufeisenförmig gebogen. Geruch süsslich und moschusartig, manchmal fruchtig. Im Wald abgesetzt, am Boden, am Fusse eines Baumes, auf einem Stamm, auf einem Ast. Braun bis schwarz, enthält Haare, Federn, Samen, Fruchtsteine oder Insekten. LA = 6-15 cm; BR = 0,8-1,3 cm.



Siebenschläfer, *Glis glis*

Kot etwas grösser, meist BR > 2 mm. Schwarz, bräunlich. Auf Bäumen der Wälder und Obstgärten der tieferen Lagen, auf Holzhaufen, in Häusern. LA = 6,5-19 mm; BR = 1,5-5 mm.





Quelle links oben (massstabsgetreu) und unten (Hermelin):
 Marchesi P. Mermod C. & Salzmann H. C. (2022). Marder, Iltis,
 Nerz und Wiesel - Kleine Tiere, große Jäger (1st ed.). Haupt.

Rechts: Beispielbilder von Hermelin Kot